

# КАЛЕНДАР ЩЕПЛЕНЬ

Sprache: Ukrainisch

ІВАКЦИНАЦІЯ ВІК

## Вакцинацію слід проводити якомога раніше.

Доцільно перевіряти статус вакцинації у будь-якому віці. Пропущені щеплення необхідно негайно заповнювати згідно з рекомендаціями для відповідного віку.

Рекомендації постійної комісії з вакцинації (STIKO), 2023. www.stiko.de

ROBERT KOCH INSTITUT



у тижнях	у місяцях							у роках									
6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	від 18	від 60
	U4			U5		U6			U7	U7a/U8	U9	U10	U11/J1		J2		

Ротавіруси	G1 <sup>a</sup>		G2	(G3)														
Правець <sup>b</sup>	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>	N			A1	N	A2	N	A <sup>e</sup>					
Дифтерія <sup>b</sup>	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>	N			A1	N	A2	N	A <sup>e</sup>					
Судомний кашель <sup>b</sup> Коклюш	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>	N			A1	N	A2	N	A3 <sup>e</sup>	N				
Гемofilьна інфекція <sup>b</sup> інфекція T <sub>yp</sub>	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>	N												
Дитячий параліч <sup>b</sup> Поліомієліт	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>	N			A1	N								
Гепатит В <sup>b</sup>	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>	N												
Пневмокок <sup>b</sup>	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>	N										S <sup>g</sup>		
Менінгокок С					G1	N												
Кір					G1	N	G2	N							S <sup>f</sup>			
Свинка, краснуха					G1	N	G2	N										
Вітрянка Вітряна віспа					G1	N	G2	N										
ВПЛ Вірус папіломи людини													G1 G2 <sup>d</sup>	N				
Оперізуєчий герпес													G1 G2 <sup>h</sup>					
Грип Інфлюєнца													S <sup>h</sup>					
COVID 19 (коронавірусне захворювання 2019 р.)													G1 G2 <sup>i</sup>	A <sup>i</sup>	S <sup>i</sup>			

## Терміни наступної вакцинації



## ПОЯСНЕННЯ

- G** БАЗОВА ІМУНІЗАЦІЯ  
(до 3-х часткових щеплень G1 - G3)
- S** СТАНДАРТНА ВАКЦИНАЦІЯ
- A** РЕВАКЦИНАЦІЯ
- N** ПОСЛІДУЮЧА ВАКЦИНАЦІЯ  
(Базова імунізація всіх ще не вакцинованих або Завершення неповної серії вакцинацій)
- U** Скринінгове обстеження
- J** Обстеження підлітків  
(J1 у віці 12–14 років)

- a** Перша доза вакцини з 6-тижневого віку, залежно від вакцини, 2-а чи 3-я доза вакцини з інтервалом не менш 4 тижнів.
- b** Недоношені діти: додаткова доза вакцини у віці 3 місяців, тобто лише 4 дози вакцини.
- c** Мінімальний інтервал від попередньої дози: 6 місяців.
- d** Дві дози вакцини з інтервалом не менше 5 місяців, з додатковою вакцинацією, починаючи від 15 років або з інтервалом між вакцинаціями менше 5 місяців між 1-ою та 2-ою дозами Потрібна 3-я доза.
- e** Ревакцинація Td (проти правця й дифтерії) кожні 10 років. Наступна обов'язкова вакцинація Td - разова вакцинація як Tdap (проти правця, дифтерії, коклюшу) або, за наявності показань, комбінована вакцинація Tdap-IPV (проти правця, дифтерії, коклюшу й поліомієліту).

- f** Разова вакцинація вакциною MMR (проти кору, свинки, краснухи) для всіх осіб, що народилися після 1970 р. ≥ 18 років з неясним статусом щеплення, без щеплення або тільки з одним щепленням у дитинстві.
- g** Вакцинація 23-валентною полісахаридною вакциною.
- h** Дворазова вакцинація ад'ювантною вакциною проти оперізувального герпесу (інактивованою вакциною) з інтервалом від 2 до 6 місяців.
- i** Дотримуйтеся інтервалів щеплення між G1 і G2, а також між G2 і A1, згідно зі вказівками спеціалістів
- j** Повторна ревакцинація з інтервалом не менше 12 місяців після останнього контакту з антигеном, бажано восени

\* Вакцинацію можна робити в кілька прийомів. MMR (проти кору, свинки, краснухи) та V можна призначати на один день або з інтервалом у 4 тижні.